

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

סטרפסילס® ללא סוכר **תות** **לכסניות למציצה**

הרכב

כל לכסניה מכילה:

2,4-Dichlorobenzyl alcohol	1.2 mg
Amylmetacresol	0.6 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Flav P strawberry Flavor 052312B, Ponceau 4R (E124), Sodium Saccharin, Tartaric Acid, Maltitol Syrup, Isomalt, Water Purified.

פעילות רפואית

תכשיר אנטיספטי ללא סוכר, להקלת כאבי גרון אצל ילדים ומבוגרים.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.

אזהרות

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין תרופתיות

אם הינך נוטלת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר): הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם רופא.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

ראה/י לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

מבוגרים וילדים: לכסניה אחת למציצה כל 2-3 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שש

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.

כאב גרון חמור, ממושך או המלווה בחום, כאב ראש או בחילה והקאות, מחייב התייעצות מיידית עם הרופא.

אופן השימוש

התרופה חייבת להיות מומסת בפה. אין ללעוס או לשבור את הלכסניה. יש למצוץ הלכסניה לאט.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה אתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך: בדוק/י התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוקה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו במקום קריר.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 1124529476

יצרן:

רקייט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ,
נוטינגהם, אנגליה.

בעל הרישום:

רקייט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ,
רחוב הנגר 6 הוד השרון 45240 |

.9.2008